


ABORDAGEM INVESTIGACIONAL + TERAPÉUTICA DE 1 DOENTE C/ NÓDULO TIROIDEU



* Deve-se operar pq a probabilidade de se estar na presença de carcinoma é >

NÓDULO DA TIROIDEIA

- ① TSH ultrasensível (se ↓ - Hipertireoidismo - pede-se cintigrafia)
- ② Ecografia Tireoideia
- ③ Citologia aspirativa, se eutireoidismo
- ④ Rx pescoço e tórax em 2 planos (PA e perfil)
- ⑤ Marcadores Tumorais
 - Tireoglobulina (tumores papilares e foliculares)
 - Calcitonina (tumor cél.c)

DOENÇA DE GRAVES

- ① TSH ultrasensível
- ② Ecografia da Tireoide
- ③ Anticorpos anti-Receptor TSH (TRAb); Antitirocitosomas
Anti Tireoglobulina
- ④ Cintigrafia

Hipercaptão Difusa da
Glândula Tireoideia

Antitirocitosomas da Síntese
Iodo radioativo

Cirurgia: tireoidectomia Subtotal, especial em doentes < 40a.

↑ difusa da glândula
c/ superfície lisa e
consistência elástica
esponjosa; pode haver
assimetria e fechos

Antitirocitosomas
Anti Tireoglobulina
Ig's Tireoide
estimuladores
(TSI)